

FICHA TECNICA



BILLARD® SC Fungicida Agrícola

Formulación: Suspensión Concentrada – SC

Grupo Químico: Triazol+ Benzimidazol

® Marca Registrada de Hanseandina

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA, PANFLETO U HOJA INFORMATIVA APROBADA POR LAS AUTORIDADES OFICIALES LOCALES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Características

BILLARD® SC, es un fungicida sistémico con doble acción: preventiva y curativa, que controla enfermedades ocasionadas por hongos del suelo y por complejos de hongos foliares y del grano en diferentes cultivos.

Tiene como ingredientes activos la combinación de dos sustancias de grupos químicos diferentes: El Triazol y el Benzimidazol, formulados como suspensión concentrada.

BILLARD® SC, actúa inhibiendo el desarrollo micelial, la división celular y el crecimiento de los hongos patógenos. El producto penetra por los tallos, yemas y hojas de la planta, gracias a su carácter sistémico y movimiento acropetal (hacia arriba).

Recomendaciones de uso

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS RECOMENDADA
ARROZ	Pudrición de la vaina <i>Sarocladiumoryzae</i>	0,4 lts/ha
	manchado del grano <i>Helminthosporium oryzae, Curvulariaspp, Cercosporaoryzae, Alternariasp, Rhynchosporiumoryzae</i>	0,4 - 0,5 lts/ha
TOMATE	tizon temprano <i>Alternaria solani</i>	0,4-0,5 lts/ha
CEBOLLA	Mancha púrpura <i>Alternaria porri</i>	0,4 - 0,5 lts/ha

FRIJOL	Antracnosis <i>Coletotrichum lindemuthianum</i>	0,3-0,5 lts/ha
CAFÉ	Roya del café <i>Hemileia vastatrix</i>	0,3 -0,4 L/ha
BANANO Y PLATANO	Sigatoka negra <i>Micosphaerella fijensis</i>	0,4- 0,6 lts/ha
ORNAMENTALES	Roya blanca <i>Puccinia horiana</i> mancha anillada <i>Heterosporium echinolatum</i> Mildeo polvoso <i>Sphaerotheca pannosa</i> Botritys <i>Botritys sp.</i>	3 c.c/litro de agua
MAIZ	Quemado de la hoja <i>Helminthosporium maydis</i>	0,2 – 0,4 L/ha
ZANAHORIA	Alternaria <i>alternaria sp.</i>	0,2 – 0,3 L/ha
ALGODÓN	Ramularia <i>Ramularia Areola at.</i>	0,2 – 0,3 L/ha

Preparación de la mezcla

BILLARD® SC se puede aplicar con los equipos convencionales de aplicación terrestre y aérea. Usar boquillas de cono hueco. Aplique BILLARD®SC, en suficiente agua para conseguir una cobertura adecuada. Para asegurar una mezcla uniforme se debe agitar perfectamente el fungicida en el recipiente. Debe añadirse la cantidad necesaria lentamente al tanque aspersor al momento de llenado. Pre mezclar la cantidad que se necesita en un recipiente limpio y después añadirlo al tanque aspersor mientras se llena. El agitador se debe mantener en movimiento mientras se llena el tanque y durante la aspersión.

Es indispensable realizar previamente un ensayo de compatibilidad cuando se desee usar conotros plaguicidas o insumos agrícolas. No es tóxico para los cultivos recomendados, siempre que se aplique utilizando las dosis establecidas.

Precauciones

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y “No ingiera alimentos, beba o fume durante la manipulación y la aplicación”.

Durante aplicaciones terrestres “Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas” Use overol ajustado en el cuello y muñecas, guantes de caucho, botas y gorra lavable para la manipulación del producto. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

Lavarse las manos y la piel expuesta con agua y jabón después de utilizar el producto. Lavar la ropa protectora.

No contamine quebradas, ríos o fuentes de agua, ni prepare el producto cerca de las mismas.

No se debe transportar ni almacenar con productos de consumo humano o pecuario.

BILLARD SC debe almacenarse en bodegas especiales lejos de casas de habitación en los envases originales, bien cerrados y en un lugar fresco lejos de alimentos, forrajes, semillas, ropa o animales

“CONSERVAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL ETIQUETADO Y CERRADO.”