

## FICHA TECNICA

METROPOL® SC Fungicida Agrícola  
 Formulación: Suspensión Concentrada – SC  
 Grupo Químico: Triazol+ Strobilurina



® Marca Registrada de Hanseandina

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA, PANFLETO U HOJA INFORMATIVA APROBADA POR LAS AUTORIDADES OFICIALES LOCALES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

### Características

**METROPOL® SC ó COSMOPOL® SC**, fungicida sistémico, trans laminar y de contacto, que se utiliza en el control preventivo, curativo y antiesporulante de enfermedades fungosas que afectan al follaje de diversos cultivos, combina el modo de acción de dos ingredientes activos, es la combinación de dos sustancias de grupos químicos diferentes: Estrobilurina y Triazol , formulados como suspensión concentrada, trabajan Inhibiendo la respiración mitocondrial en los hongos y la biosíntesis de ergosterol, lo que asegura un amplio espectro de control durante un período prolongado y reduce el riesgo de aparición de cepas resistentes.

**METROPOL® SC ó COSMOPOL® SC** penetra y se transloca muy rápidamente en la planta, siendo absorbido en menos de una hora y luego distribuido hacia los nuevos tejidos del vegetal. Esto permite dejar al cultivo debidamente y rápidamente protegido del ataque de los hongos. Se mueve vía xilema (movimiento acropétalo) y tiene sistemicidad y movimiento translaminar, protegiendo completamente las hojas y brotes nuevos.

### Recomendaciones de uso

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
SOYA	<b>Roya Suramericana</b> ( <i>Phakopsora meibomia</i> )	0,3 L/ha
ARROZ	<b>Complejo Manchado De Grano</b> ( <i>Helminthosporium oryzae</i> , <i>Cercospora oryzae</i> , y <i>Sarocladium oryzae</i> )	0,5–0,6 L/ha
	<b>Añublo de la vaina</b> ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	
	<b>Pudrición de la vaina</b> ( <i>Sarocladium oryzae</i> )	
	<b>Piricularia en cuello</b>	0,8-1,0 L/ha

	<i>(Pyriculariagrisesa)</i>	
<b>Banano</b>	<b>Sigatoka negra</b> <i>(Mycosphaerellafijiensis)</i>	<b>0.4 L/ha</b>
<b>Tomate</b>	<b>Tizón temprano</b> <i>(Alternariasolani)</i>	<b>0,2-0,3 L/ha</b>
<b>Cebolla</b>	<b>Mancha púrpura</b> <i>(Alternariaporri)</i>	<b>0.3 - 0.4 l/ha</b>
	<b>Amarilladera</b> <i>(Alternariasp)</i>	
<b>Maíz</b>	<b>Mancha de asfalto</b> <i>(Phyllachoramaydis - Monographellamaydis)</i>	<b>0.3 - 0.4 l/ha</b>
<b>Café</b>	<b>Roya del cafeto</b> <i>(Hemileiavastatrix)</i>	<b>0,6-1,2 L/ha</b>
<b>Zanahoria</b>	<b>Alternaria</b> <i>(Alternariadauci)</i>	<b>1 cc/L de agua</b>
<b>Ornamentales</b>	<b>Mildeo Polvoso</b> <i>(Sphaerothecapannosa)</i>	<b>0.8 cc / L de Agua</b>
<b>Repollo</b>	<i>(Alternaria brassicae)</i>	<b>0,15-0,25 L/ha</b>
<b>Tabaco</b>	<b>Mancha foliar</b> <i>(Cercosporanicotianae)</i>	<b>0,1 L/ha</b>
<b>Pimentón</b>	<b>Oidio</b> <i>(Leveillulataurica)</i>	<b>50-100 cc/ha</b>

### **Preparación de la mezcla**

Ponga agua hasta un tercio de la capacidad del depósito, agregue METROPOL®SC y agite hasta su total emulsión. Complete con agua hasta la capacidad máxima del tanque.

En caso de mezclas de METROPOL®SC con polvos mojables, recuerde hacer el mezclado previo del polvo y después añadir METROPOL®SC y agitar vigorosamente.

### **Compatibilidad**

**METROPOL SC** no debe mezclarse con productos plaguicidas, surfactantes o fertilizantes foliares sin antes realizar una prueba de compatibilidad. Se recomienda no mezclarlo con organofosforados.

**METROPOL SC** no es fitotóxico a las dosis recomendadas en esta etiqueta.

### **Precauciones**

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y “No ingiera alimentos, beba o fume durante la manipulación y la aplicación”.

Durante aplicaciones terrestres “Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas” Use overol ajustado en el cuello y muñecas, guantes de caucho, botas y gorra lavable para la manipulación del producto. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

Lavarse las manos y la piel expuesta con agua y jabón después de utilizar el producto. Lavar la ropa protectora.

No contamine quebradas, ríos o fuentes de agua, ni prepare el producto cerca de las mismas.

No se debe transportar ni almacenar con productos de consumo humano o pecuario.

**METROPOL SC** debe almacenarse en bodegas especiales lejos de casas de habitación en los envases originales, bien cerrados y en un lugar fresco lejos de alimentos, forrajes, semillas, ropa o animales

“CONSERVAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL ETIQUETADO Y CERRADO.”

---

### **Presentaciones Comerciales**

Envase Plástico de 20 Litros, 4 Litros, 1 Litro y 250 c.c.

---